

## ***OH-Broma VS***

### **Mélange pour prairie extensive riche en espèces**

Prairie fleurie, pour endroit plutôt sec, mélange composé en majorité d'écotype VS. Hauteur : env. 50 à 60 cm, deux fauches par an (env. fin juin et fin septembre).

### **Choix de l'emplacement**

Les endroits pauvres, plutôt secs, ensoleillés avec peu de pression de mauvaises herbes se prêtent bien à cette culture. Faites preuve de patience. Vous obtiendrez une prairie riche en espèces !

### **Semis**

La majorité des fleurs sauvages poussent mieux sur un sol bien tassé et grumeleux.

- Griffer au râteau
- Semer en surface
- Compacter avec le dos d'une pelle
- Maintenir humide les premières semaines

### **Entretien**

La présence de mauvaises herbes annuelles au semis n'est pas forcément un inconvénient, elles agissent comme couverture ! Il faut effectuer la coupe de nettoyage au bon moment, dès que le sol est couvert par la végétation. La première année, il peut être nécessaire d'effectuer jusqu'à 3 coupes de nettoyage. Hauteur de coupe : 7 à 9 cm. Evacuer la matière végétale.

### **Densité de semis**

Semer 10 gr/m<sup>2</sup>

**Botanica****Deutsch****Français**

Ajuga reptans	Kriechender Günsel	Bugle rampant
Anthyllis carpatica	Karpaten-Wundklee	Anthyllide des carpates
Anthoxanthum odoratum	Duftendes Ruchgras	Flouve odorante
Arrhenatherum elatius	Fromental Glatthafer	Fenasse
Briza media	Mittleres Zittergras	Brize intermédiaire
Bromus erectus	Aufrechte Trespe	Brome dressé
Campanula glomerata	Büschel-Glockenblume	Campanule agglomérée
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	Campanule à feuilles rondes
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	Centaurée jacée
Centaurea scabiosa	Scabiosen-Flockenblume	Centaurée scabieuse
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	Sarriette vulgaire
Crepis biennis	Zweijähriger Pippau	Crépide bisannuelle
Daucus carota	Gewöhnliche Möhre	Carotte sauvage
Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	Fétuque des prés
Festuca rubra rubra	Ausläufer-Rotschwingel	Fétuque rouge traçante
Galium verum	Echtes Labkraut	Gaillet jaune
Helictotrichon pubescens	Flaumhafer	Avoine pubescente
Knautia arvensis	Acker-Witwenblume	Knautie des champs
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	Gesse des prés
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	Léontodon hispide
Leucanthemum vulgare	Margerite, Wucherblume	Marguerite
Lotus corniculatus	Gewöhnlicher Hornklee	Lotier corniculé
Medicago lupulina	Hopfenklee	Luzerne lupuline
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette	Esparcette à feuilles de vesce
Picris hieracioides	Habichtskrautartiges Bitterkraut	Picride fausse épervière
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	Plantain lancéolé
Plantago media	Mittlerer Wegerich	Plantain moyen
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	Pâturin des prés
Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuss	Renoncule bulbeuse
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	Sauge des prés
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	Pimprenelle
Silene nutans	Nickendes Leimkraut	Silène penché
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	Silène commune
Thymus pulegioides	Arznei-Feld-Thymian	Thym serpolet
Tragopogon dubius	Grosser Bocksbart	Salsifis douteux
Tragopogon orientalis	Östlicher Bocksbart	Salsifis oriental
Trifolium montanum	Berg-Klee	Trèfle des montagnes
Trifolium pratense	Rot-Klee	Trèfle des prés
Trisetum flavescens	Wiesen-Goldhafer	Avoine dorée
Vicia cracca	Vogel-Wicke	Vesce cracca